Gebruiksrichtlijnen 3M™ Cavilon™ Niet-prikkende Barrièrefilm

3M™ Cavilon™ is een polymeerfilm die een onzichtbare barrière vormt op de huid en zo **de gezonde huid beschermt tegen beschadiging, en dit gedurende 72 uur.**

Bescherming tegen

- ✔ Huidverweking aan wondranden en stomiezones.
- ✔ Stripping ingevolge het herhaaldelijk verwijderen van adhesieve producten.
- ✔ Irritatie door contact met lichaamsvloeistoffen.

Referentie	Eenheid	Aantal per doos
3343E	1 ml swab	25
3343P*	1 ml swab	5
3345E	3[redacted]	25
3345P*	3 ml swab	5
3346E	28 ml sprayflacon	12
3346P*	28 ml sprayflacon	1

(*) in apotheek

Voordelen

- ✔ **Zonder alcohol :** pijnloos, dus meer comfort voor de patiënt.
- ✔ **Niet cytotoxisch.**
- ✔ **Beperkt** de verzorgingstijd alsook de totale kost van de behandeling.
- ✔ **Semi-doorlaatbare, efficiënte barrière.**
- ✔ **Versterkt de kleefkracht van pleisters.**
- ✔ **2 gebruiksvriendelijke aanbrengmethodes :** swabs en sprayflacon.

3M Health Care

Incontinentie

➜ **Oorzaak van huidbeschadiging** : direct contact met urine en/of faeces en wassen van de huid.

✔ Cavilon mag ook op beschadigde huid (zoals wondjes en ontvellingen) gebruikt worden, mits de huid droog is.

Aanbrengschema

Preventief of milde irritatie	1-3x	Iedere 72 uur
	>3x	Iedere 48 uur
Ernstige irritatie of ontvelling	1-3x	Iedere 48 uur
	4-6x	Iedere 24 uur
	>6x incontinentie-periodes/dag	Iedere 24 uur of vaker

Wondrandbescherming

➜ **Oorzaak van de huidbeschadiging:** aanhoudend contact met (agressief) wondvocht, eventueel door bedekkende wondverzorgingsproducten.

✔ Ook te gebruiken bij smetplekken.

✔ Wondverzorgingsproducten kunnen eenvoudig over Cavilon aangebracht worden. Klevende verbanden hechten vaak zelfs beter.

✔ Bij openingen zoals PEG sondes, drains, trachea canules, maar ook fistels, kan eenvoudig de omliggende huid met Cavilon beschermd worden.

Klevende producten →	Vóór het aanbrengen van het nieuwe verband
Overige producten →	1 x per 2 dagen Bij maceratie; 1 x per dag Bij schilfering; 1 x per 3 dagen

Stoma's

➜ **Oorzaak van huidbeschadiging :** frequent verwijderen van (klevende) stomaplaten en/of lekkage uit een ileo-, colon- en/of urostoma.

✔ Indien het gebruik van Cavilon op een stoma niet gewenst is, gebruik dan een swab voor nauwkeurige applicatie rond de stoma.

Eendelig en twee-delig systeem →	Vóór het aanbrengen van iedere nieuwe stomaplaat

Onder kleeflagen

➜ **Oorzaak van huidbeschadiging:** repetitief verwijderen van hechtpleisters en/of klevende producten of bij toepassingen op een fragiele huid (vb. gezicht).

✔ Cavilon creëert een extra laag op de huid die voorkomt dat de bovenste laag van de huid wordt losgetrokken (stripping) bij het verwijderen van de kleeflaag.

✔ Verwijder klevende materialen altijd langzaam, zachtjes trekkend, parallel aan de huid, in de richting van de haargroei (terwijl de huid met de andere hand gesteund wordt).

✔ Cavilon is ook zeer geschikt voor gebruik onder condoomcatheters.

Vóór het aanbrengen van hechtpleisters/klevende producten

3M

3M Belgium N.V./S.A.
Afdeling Health Care

Hermeslaan 7
B-1831 Diegem
Tel : 02 722 53 51 - Fax : 02 722 50 22
www.3M.be

Commitment, Care, Confidence in 3M Skin Health